



CITOLOGÍAS Y TOMA DE VPH

Recomendaciones generales

« **No** tener relaciones sexuales las últimas 24 horas previas al examen.

« **No** utilizar duchas intravaginales, tampones ni anticonceptivos vaginales 48 horas antes de la toma de muestra.

« **No** utilizar medicamentos tópicos vaginales (óvulos o cremas) deben haber pasado 48 horas.

« **No** debe haber sangrado, esperar por lo menos 3 días después de finalizado el periodo menstrual, a menos que sea sangrado anormal.

« La toma de **citología y VPH se puede realizar en el mismo momento**, la Citología se debe tomar primero.

« La repetición del procedimiento de toma por insatisfacción de la muestra requiere un **periodo mínimo de 1 mes para la nueva toma**.

« Si tiene un procedimiento ecográfico transvaginal **se prefiere realizar la toma de citología antes de este o 24 horas después**.

« Las **citologías posteriores al parto** deben programarse después de la semana 12 de puerperio. « Las **citologías posteriores al parto** deben programarse después de la semana 12 de puerperio.

« Los lubricantes y medicamentos antifúngicos **pueden interferir en el ensayo**.

« Si se han realizado procedimientos ginecológicos como biopsias, cauterización o conización se requiere un **periodo mínimo de 3 meses de espera para la toma**.

« **En mujeres embarazadas**, la presencia de alguno de estos síntomas requiere la toma por especialista en obstetricia: amenaza de aborto previa, antecedente de incompetencia cervical o gestaciones de alto riesgo.

« Si no se toman las muestras de citología y VPH en el mismo momento, la toma posterior de una citología **requiere un periodo mínimo de 1 mes**.